agena.s. AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

PNE 2017

A.O. PapardoMessina(ME) SICILIA

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	109	79,82	82,53	1,18
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	252	9,92	15,27	1,78
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	164	18,29	19,45	1,87
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	101	17,82	15,54	1,06
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	22	0	-	-
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	422	0,24	0,26	0,5
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	422	0,24	0,25	0,44
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	12	8,33	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	93	9,68	11,09	1,02
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	86	6,98	6,96	0,98
BPCO riacutizzata: mortalit&agrave a 30 giorni	57	24,56	32,34	3,47
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	251	9,96	14,98	1,9
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	22	50	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	20	0	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	2	0	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	47	8,51	-	-
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	292	0	-	-
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	292	1,71	1,79	2,09
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	66	3,03	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	1	0	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	10,71	12,78	2,49
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	10,71	10,3	0,55
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	34	17,65	14,48	1,04
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	63	3,17	-	-
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	33	12,12	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	541	9,61	12,42	1,07
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	9	11,11	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	4	25	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	22	63,64	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	9	11,11	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	22	0	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	63	0	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	50	0	-	-
valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	207	5,31	5,13	1,93
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	211	6,16	6,19	0,77
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	58	22,41	36,94	2,25
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	578	20,76	24,66	1,01
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	112	7,14	5,21	0,97
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	112	74,11	77,71	1,34
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	165	5,45	5,37	1,21
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	27	0	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	82	1,22	1,17	0,95
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	70	8,57	7,17	2,12
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	3	0	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	48	2,08	-	-
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	52	0	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	4	0	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	8	12,5	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	252	65,48	72	1,61
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	10	10	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	47	8,51	-	-
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	9	11,11	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	256	11,33	13,51	1,33
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	256	18,75	17,46	0,81
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	252	76,98	78,21	1,26
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	319	5,02	4,65	2,16